




学校结核病防治知识讲座

什么是结核病，结核病是如何传染的？



结核病是由结核杆菌侵入人体引起的一种慢性传染病，可能发生在人体的任何部位，如：肺、淋巴、骨、肾、肠、尿路等。呼吸是呼吸道传染病，肺结核病人具有传染性。

结核病人咳嗽或打喷嚏时，将带有结核菌的微沫散播于空气中，悬浮于空气中的结核菌可存活9个小时以上，健康人吸入带有结核菌的微沫可受到结核菌的传染。



肺结核病常见的
症状是什么？



肺结核病主要症状有咳嗽、咳痰，1/3病人有数量不等的咳血。在咳嗽、咳痰两周以上或有咳血时患肺结核可能性增加，定为肺结核病可疑症状。有的人会出现低烧、盗汗、胸痛、食欲差、疲劳和消瘦。



怀疑有肺结核应当
怎么办？

怀疑或确诊的肺结核病人，均
应转至结核病防治专业机构或指定
的医疗卫生保健机构实行“归口管
理”，既有利于病人也有利结核病的
控制。



诊断肺结核主要
做哪些检查？

肺结核的主要检查
项目有结核菌素试验、
痰涂片和X光胸片检查，
必要时可进行痰培养
检查。

留痰检查



拍X光片



结核病能治愈
吗？

确诊的肺结核病人都要按照“早期、规律、全程、联合、适量”的治疗原则、在医务人员的指导帮助下用抗结核药物治疗。只要规则治疗，完成疗程，大多数肺结核病人是可以治疗好的。



政府对结核病防治
有哪些减免政策？

县（区）级结核病防治机构为第一次检查的肺结核可疑症状者免费提供痰涂片和X光胸片检查；为活动性肺结核病人提供国家统一方案的抗结核药物、治疗期间的痰涂片检查及治疗结束后的X光胸片检查。





学生肺结核患者应该注意哪些问题？

学生得了传染性肺结核，要主动向学校校医和班主任报告，不要隐瞒病情。应该休学在家疗养。待传染性消失后，凭结核病防治机构的诊断证明可以复学，非传染性病人在治疗期间可以继续上学，但要继续规范服药治疗。







学生肺结核患者应该注意哪些问题？

同宿舍或同班同学是肺结核病人的密切接触者，不管有没有出现可疑症状，都得尽快到医院进行检查。

拍胸片
检查。



查痰





学生肺结核患者应该注意哪些问题？

养成良好的卫生习惯，避免传染他人。

有痰时，一定要吐出来，不要下咽，也不能随地吐痰，应该将痰吐到纸中包好焚烧，或吐在带有消毒液的痰盂中。

咳嗽、打喷嚏时要用纸巾或手帕掩住口鼻，不要对着他人大声说话。

传染期内尽量少去公共场所，去时应佩戴口罩。





学生肺结核患者应该注意哪些问题？

按要求规范服药，不得随意中断治疗。





如何预防肺结核？

◆养成良好的卫生习惯：

生活有规律，坚持体育锻炼，保持健康的身心，增强机体抵抗力；勤洗手、多通风、不随地吐痰、强身健体可以有效预防结核病。

◆如果有可疑症状，要及时到结核病防治机构就诊。确诊后按医生要求正规服药。

◆学生或者老师得了传染性肺结核，一定要休学或者休假隔离治疗，避免传染给他人。根据结防机构诊断证明才能复学。



结核病防治核心信息

- × 1.肺结核是我国发病、死亡人数最多的重大传染病之一。
- × 2.肺结核主要通过咳嗽、打喷嚏传播。
- × 3.勤洗手、多通风、强身健体可以有效预防肺结核。
- × 4.咳嗽喷嚏掩口鼻、不随地吐痰可以减少肺结核的传播。
- × 5.如果咳嗽、咯痰2周以上，应及时到医院诊治。
- × 6.我国在各级各地疾控中心或结核病定点医疗卫生机构对肺结核检查治疗的部分项目实行免费政策。
- × 7.肺结核病检查是学校常规体检项目之一。
- × 8.教师有义务对学生开展肺结核病防治健康教育，并督促咳嗽、咯痰2周以上的学生及时就医。
- × 9.学校依据各级各地疾控中心或结核病定点医疗卫生机构的诊断证明，管理学生患者的休学、复学。
- × 10.坚持完成6-8个月的全程规范治疗，90%以上的患者是可以治愈的，同时也是避免形成耐药的关键。
- × 11.避免肺结核传播是保护家人、关爱社会的义务和责任。



祝同学们身体健康，天天快乐！

**请不要忘了把今天学到的
知识告诉家人和朋友们哟！**

社会公共参与，消除结核危害。



Thanks!
谢谢聆听!

